


होम आइसोलेशन के  
पेशेंट्स के लिए गाइडलाइन

# कोरोना से घबराएं नहीं ये उपाय अपनाएं

तीन बार भाप लें और  
पिएं गुनगुना पानी





कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है. देश में बहुत से पेशेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनमें इसके कोई लक्षण नहीं दिख रहे. सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस समय 71 हजार कोरोना मरीजों में से करीब 40 हजार ऐसे हैं, जो घर पर रहकर ही अपना इलाज करा रहे हैं.


स्टेट सर्विलांस आफिसर डा. विकासेंदु अग्रवाल की ओर से ऐसे मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल एडवाइजरी जारी की गई है. इसके बारे में जानना आपके लिए भी जरूरी है.

## आइवरमेक्टिन टैबलेट पांच दिन

❑ पहले आइवरमेक्टिन **तीन दिन** खिलाई जा रही थी, लेकिन इन्फेक्शन को देखते हुए इसे **पांच दिन** तक देने की सलाह दी गई है.

❑ होम आइसोलेशन में मरीज दवा के साथ-साथ दिन भर में **चार लीटर** गुनगुना पानी पिएं और तीन से चार बार भाप जरूर लें.

❑ प्रेगनेंट महिलाओं, ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाओं व दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दवाएं नहीं देनी हैं. बाकी दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें.




## कैसे लें दवा

अगर पेशेंट का वेट 50 किलोग्राम से कम है और बुखार 100 डिग्री फारेनहाइट से कम है तो पैरासिटामोल की 500 एमजी की एक टेबलेट दिन भर में तीन बार लें.



अगर पेशेंट का वेट 50 किलोग्राम से ज्यादा है और बुखार 100 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा है तो पैरासिटामोल की 650 एमजी की एक टेबलेट दिन भर में तीन बार लें.



## आइवरमेक्टिन की 12 एमजी


एक गोली एडल्ट व्यक्तियों के लिए पूरे दिन में एक बार सिर्फ रात में खाने के दो घंटे बाद खानी है। पांच दिन तक यह दवा खानी है। प्रेगनेंट महिला, ब्रेस्टफीड कराने वाली महिला और दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं लेनी है। बाकी बच्चों के लिए डॉक्टर्स से परामर्श कर दवा लें।

## डाक्सीसाईक्लिन का 100 एमजी

कैप्सूल एडल्ट व्यक्ति को दिन में दो बार पांच दिन तक खाना है। प्रेगनेंट, ब्रेस्टफीड कराने वाली महिला और दो वर्ष तक के बच्चों को नहीं देनी है। बाकी बच्चों के लिए डॉक्टर से एडवाइज लेना होगा।

## एजिथ्रोमाइसिन की 500 एमजी


टैबलेट एडल्ट व्यक्ति को दिनभर में एक बार पांच दिन तक खानी है। इसे भी प्रेगनेंट महिलाएं, ब्रेस्टफीड कराने वाली महिला और दो वर्ष तक के बच्चों को नहीं देनी है। बाकी बच्चों के लिए डॉक्टर से एडवाइज लेना होगा।



## ये भी जानें

यदि डाक्सीसाईक्लिन पांच दिन खाने के बाद भी बुखार रहता है तो कोरोना पाजिटिव आने के छठें दिन से एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट पांच दिन देना है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर का परामर्श जरूर लें.

- ❑ **विटामिन सी की 500 एमजी** की एक टैबलेट दिन में तीन बार 10 दिन तक रोगी को खानी है.
- ❑ **जिंक की 50 एमजी** की एक गोली दिन में दो बार 10 दिन तक खानी है.
- ❑ **विटामिन बी कांप्लेक्स** का एक कैपसूल दिन में एक बार 10 दिन तक खाना है.
- ❑ **विटामिन डी थ्री** -60,000 यूनिट हर सप्ताह में एक बार दूध या पानी के साथ



## यह भी रखें ध्यान

**आक्सीजन सैचुरेशन  
94 प्रतिशत से अधिक  
होना चाहिए**



कोरोना मरीज पल्स  
आक्सीमीटर से दिन में तीन  
से चार बार श्वसन दर तथा

आक्सीजन सैचुरेशन अवश्य नापें. पल्स आक्सीमीटर  
से आक्सीजन सैचुरेशन नापें और यह 94 प्रतिशत से  
अधिक होना चाहिए.

**40 से 50 मिनट तक करें योग व प्राणायाम**

कोरोना संक्रमित रोगी दिन  
में योग व प्राणायाम सुबह  
40 से 50 मिनट तक करें.  
सांस से संबंधित योग व  
व्यायाम करें. अगर आप  
सहज महसूस कर रहे हों  
तभी योग करना है अथवा नहीं.

